

Министерство образования и науки Республика Бурятия
ГБПОУ СПО «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова»

Рецептурная тетрадь

для студентов отделения «Ветеринария»

студентки (та) _____

группы _____

Улан-Удэ 2017

ВВЕДЕНИЕ

«Рецептурная тетрадь для студентов» разработана по специальной учебной дисциплине «Латинский язык в ветеринарии», устанавливающей базовые знания при освоении профессиональных компетенций.

Одна из целей изучения латинского языка – овладение навыками написания рецептов для дальнейшего применения на клинических дисциплинах и в будущей профессиональной деятельности. В пособии изложен материал, необходимый для овладения навыками выписывания рецептов на все лекарственные формы:

- краткие сведения о рецепте,
- модель грамматической зависимости в шестой части рецепта,
- порядок выписывания рецептов, дополнительные надписи на рецептах,
- сокращения в рецептах,
- примеры выписывания рецептов на различные лекарственные формы.
-

Тетрадь включает задания по выписыванию рецептов на все лекарственные формы, которые в дальнейшем используются при изучении специальных дисциплин и профессиональных модулей.

Разработчик: Арюткина Л.В.

Краткие сведения о рецепте

Рецепт – (от лат. *recipere* — брать обратно) — письменное или устное обращение врача (веттехника) в аптеку об отпуске или изготовлении лекарства больному животному с указанием способа его применения.

Рецепт — официальный документ, за который несут юридическую ответственность лица, выписавшие его, провизор-технолог (фармацевт), отпустивший или приготовивший лекарственную форму, и ветеринарный специалист, применивший лекарство больному животному. Поэтому рецепт — очень важный документ, и малейшие неточности в нем могут привести к весьма печальным результатам.

Inscriptio. Рецепт начинается с *Inscriptio* (надпись, заглавление). К этой части рецепта относится штамп лечебного учреждения, в котором указаны название учреждения, его адрес и номер телефона. Здесь же проставляют дату выписки рецепта и указывают краткие сведения о больном животном (вид, кличку или номер; для молодняка и старых животных — возраст и фамилию владельца животного, если владельцем является частное лицо его адрес). В следующей строчке пишут фамилию, имя, отчество врача.

Praepositio-обращение врача в аптеку об изготовлении лекарства обозначается словом *Recipe* — возьми (сокращенно *Rp.:*) — повелительная форма от глагола *recipere*- брать.

Designatio materialiarum. После *Rp.:* перечисляют лекарственные вещества, входящие в состав лекарственной формы. Их названия пишут на латинском языке с большой буквы с новой строчки в родительном падеже и в строго определенном порядке. Наименование препаратов должно соответствовать фармакопейной номенклатуре или их синонимам. С большой буквы в рецептах пишут видовые названия лекарственных растений (*Tinctura Valerianae* — настойка валерианы).

С правой стороны от написанного лекарственного вещества указывают его дозу в десятичной системе измерения. За единицу массы в аптечной практике принят 1 г; в рецептах пишут «1» запятая «0» (1,0; 5,0; 250,0). Для обозначения дозы часто пользуются величинами меньше грамма. 0,1 г = 1 дециграмму (сокращенно деци — 0,2; 0,5), 0,01 г = 1 сантиграмму (сокращенно санти — 0,05; 0,15), 0,001 г = 1 миллиграмму (сокращенно милли — 0,003; 0,015). Например: 0,0005-полмиллиграмма; 0,0001 - 1 децимиллиграмм; 0,00001 - 1 сантимиллиграмм и т. д. Дозы лекарственных средств в последнее время указывают в г, мг/кг и ЕД. Количество жидких лекарственных веществ обозначается в миллилитрах (ml) или каплях (*gutta*) (5 ml, 500 ml, *gtts. V* — капель пять). В 1 мл (см³) дистиллированной воды 20 капель, масса капли 0,05 г.

При выписывании лекарственных средств в единицах действия (ЕД) в рецепте указывают число ЕД (*Benzylpenicillini-natrii 500 000 ЕД*). Количество вещества, входящего в пропись, пишут на правой стороне бланка рядом с наименованием вещества или на строчке ниже. Первым при перечислении лекарственных веществ в сложном рецепте пишут главное вещество (**Remedium basis**), определяющее действие лекарства. Далее, если это нужно, указывают вспомогательное вещество (**Remedium adjuvans**), усиливающее или расширяющее действие главного вещества. Третьим при необходимости указывают вещество, исправляющее вкус или запах (**Remedium corrigens**). Последним

Рецепты,

используемые на дисциплинах: «Ветеринарная фармакология», «Ветеринарная хирургия»

<p>1. Выписать 1000 мл 0,5% раствора фурацилина (Furacilinum). Для стерилизации катетеров.</p>	
<p>2. Выписать 200 мл 5% спиртового раствора йода (sol. Iodi spirituosa). Назначить для обработки ран.</p>	
<p>3. Выписать 500 мл 0,5 % раствора калия перманганата (Kalii permanganas). Назначить для промывания ран.</p>	
<p>4. Выписать 1000 мл этилового спирта (Spiritus aethylicum) 96 %. Назначить для операционной.</p>	
<p>5. Выписать развёрнутым способом спиртовый раствор бриллиантовой зелени (Viridis nitentis), состоящий из 1,0 бриллиантовой зелени и 100 мл 70 % этилового спирта (Spiritus aethylicus). Назначить для перевязочной</p>	
<p>6. Выписать хлорид кальция (Calcii chloridum) 10 г и воды 100 мл. Назначить наружно, для дренирования гноящихся ран.</p>	

<p>14. Выписать 50,0 цинко салициловой (Zincum salicylatae) пасты. Собаке.</p>	
<p>15. Выписать собаке 10 суппозиторий с содержанием ихтиола (Ichthyolum) по 0,2 г в каждом.</p>	
<p>16. Выписать свинье кашку, содержащую тетрациклин (Tetracyclinum) (2 г на приём), на 6 приёмов.</p>	
<p>17. Выписать порошки норсульфазола (Norsulfazolum) на 15 приёмов. Разовая доза 1,0. Собаке.</p>	
<p>18. Выписать сульфадимизин (Sulfadimezinum) в таблетках по 0,5 на курс лечения 5 дней. Разовая доза 1,0. Число приёмов в сутки - 3</p>	
<p>19. Выписать ихтиол (Ichthyolum) в виде болюсов на 6 приёмов. Разовая доза 10,0</p>	
<p>20. Выписать телёнку 50 драже «Ундевит» Undevitum.</p>	

<p>7. Выписать 200 мл эмульсии из 30 мл масла касторового (Oleum Ricini). Внутри на 3 приёма.</p>	
<p>8. Выписать микстуру, в состав которой входит 180 мл настоя из 6,0 травы горичвета (Herba Adonidis) и 0,12 натрия бромида (Natrii bromidum). Внутри по 1 столовой ложке 3 раза в день.</p>	
<p>9. Выписать 10 мл 0,5%- ной суспензии гидрокортизона (Hydrocortisonum). По 1-2 капли в глаз каждые 4 часа.</p>	
<p>10. Выписать 20 мл экстракта крушины жидкого (Frangula fluidum). Внутри по 20 капель 2 раза в день.</p>	
<p>11. Выписать слизь из семян льна (Semina Lini) внутри на 3 приёма.</p>	
<p>12. Выписать 200,0 0,5%- ной йодоформенной (Iodoformium) мази. Наружно.</p>	
<p>13. Выписать лошади линимент синтомицина (Sinthomycinum) 5% -20 мл. Наружно. На рану 3 раза в день.</p>	

**Рецепты,
используемые на дисциплине: «Ветеринарная фармакология»**

1. Выписать 30 мл настойки ва- лерианы (Valeriana) . Назна- чить внутрь по 30 капель 3 раза в день.	
2. Выписать настой травы по- лыни (Herba Absinthii) на 6 приёмов. Доза травы - 20,0. Ко- рове.	
3. Выписать телёнку сбор, со- стоящий из цветков ромашки (Flores Chamomillae) , листьев мальвы (Folia Malvae) и кор- ней алтея (Radices Althaeae) по 15 г каждого.	
4. Выписать собаке 30 г касторо- вого масла (Oleum Ricinum) в желатиновых капсулах (Capsulis gelatinosis elasticis)	
5. Выписать 200 мл отвара из ли- стьев толокнянки (Folia Uvaursi) . По столовой ложке 6 раз в сутки. Собаке.	
6. Выписать стерильный 5%- ный раствор новокаина (Novocai- num) - 200 мл для обезболива- ния.	

**Рецепты,
используемые на дисциплине: «Ветеринарная фармакология»**

<p>1. Выписать 30 мл настойки ва- лерианы (Valeriana). Назна- чить внутрь по 30 капель 3 раза в день.</p>	
<p>2. Выписать настой травы по- лыни (Herba Absinthii) на 6 приёмов. Доза травы - 20,0. Ко- рове.</p>	
<p>3. Выписать телёнку сбор, со- стоящий из цветков ромашки (Flores Chamomillae), листьев мальвы (Folia Malvae) и кор- ней алтея (Radices Althaeae) по 15 г каждого.</p>	
<p>4. Выписать собаке 30 г касторо- вого масла (Oleum Ricinum) в желатиновых капсулах (Capsulis gelatinosis elasticis)</p>	
<p>5. Выписать 200 мл отвара из ли- стьев толокнянки (Folia Uvaursi). По столовой ложке 6 раз в сутки. Собаке.</p>	
<p>6. Выписать стерильный 5%- ный раствор новокаина (Novocai- num) - 200 мл для обезболива- ния.</p>	

<p>7. Выписать 200 мл эмульсии из 30 мл масла касторового (Oleum Ricini). Внутрь на 3 приёма.</p>	
<p>8. Выписать микстуру, в состав которой входит 180 мл настоя из 6,0 травы горюцвета (Herba Adonidis) и 0,12 натрия бромида (Natrii bromidum). Внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день.</p>	
<p>9. Выписать 10 мл 0,5%- ной суспензии гидрокортизона (Hydrocortisonum). По 1-2 капли в глаз каждые 4 часа.</p>	
<p>10. Выписать 20 мл экстракта крушины жидкого (Frangula fluidum). Внутрь по 20 капель 2 раза в день.</p>	
<p>11. Выписать слизь из семян льна (Semina Lini) внутрь на 3 приёма.</p>	
<p>12. Выписать 200,0 0,5%- ной йодоформенной (Iodoformium) мази. Наружно.</p>	
<p>13. Выписать лошади линимент синтомицина (Sinthomycinum) 5% -20 мл. Наружно. На рану 3 раза в день.</p>	

<p>14. Выписать раствор натрия гидроксида (Natrii hydroxydum). Для стерилизации загрязнённых гноем инструментов.</p>	
<p>15. Выписать 10 ампул по 10 мл 10 % раствора кальция хлорида (Calcii chloridum) назначить для в/в введения.</p>	
<p>16. Выписать 10 ампул по 1 мл 0,1 % раствора атропина сульфата (Atropini sulfas). Назначить по 0,5 – 1 мл в/м.</p>	
<p>17. Выписать натрий тетраборат (Natrii tetraboras) 100 г. Раствор для стерилизации инструментов кипячением.</p>	
<p>18. Выписать 10% -ную ихтиоловую мазь (Ichthyolum) 100 мл для повязки.</p>	
<p>19. Выписать 30 ампул по 1 мл 1 % раствора викасола (Vikasolum). Лошади. Внутримышечно. При внутренних кровотечениях.</p>	
<p>20. Выписать 10 ампул по 2 мл 50 % раствора анальгина (Analginum). Назначить по 2 мл в/м при болях.</p>	

Рецепты,

используемые на дисциплинах: «Ветеринарная фармакология» и «Эпизоотология с микробиологией»

<p>1. Выписать 10 флаконов <i>левомицетина (Levomitsetinum natrium)</i> по 1,0. Назначить в/м 2 раза в сутки по 1,0, предварительно растворив в 5 мл 0,5% раствора новокаин</p>	
<p>2. Выписать 30 таблеток <i>эритромицина (Erythromycinum)</i> по 0,25. Назначить по 2 таблетки через 6 часов в течение 7 дней.</p>	
<p>3. Выписать 10 ампул по 1 мл 4 % раствора <i>гентамицина (Gentamycinum)</i>. Назначить по 1 мл 2 раза в сутки в/м.</p>	
<p>4. Выписать 10 флаконов по 1,0 <i>стрептомицина сульфата (Streptomycini sulfas)</i>. Назначить по 1,0 в/м 2 раза в сутки, предварительно растворив в 5 мл 0,5 % раствора новокаина</p>	
<p>5. Выписать 20 таблеток <i>фталазола (Phthalazolium)</i> по 0,5. Назначить по 2 таблетки 6 раза в день.</p>	
<p>6. Выписать 20 таблеток <i>фуразолидона (Furazolidonum)</i> по 0,05. Назначить по 2 таблетки 4 раза в день.</p>	
<p>7. Выписать 20 таблеток <i>фурадоина (Furadoninum)</i> по 0,1. Назначить по 1 таблетке 4 раза в день.</p>	

<p>7. Выписать 100 мл 10 % раствора нашатырного спирта (<i>Ammonii causticum</i>). Назначить для операционной.</p>	
<p>8. Выписать 150 мл эфира для наркоза (<i>Aether pro narcosi</i>). Назначить для наркоза.</p>	
<p>9. Выписать 100 мл 70 % раствора этилового спирта (<i>Spiritus aethylicus</i>). Назначить для перевязочной.</p>	
<p>10. Выписать 10 ампул по 5 мл 2 % раствора новокаина (<i>Novocainum</i>). Назначить для обезболивания переломов.</p>	
<p>11. Выписать стрептоцид(<i>Streptocidum</i>) 10 г. Собаке. Для присыпки на рану.</p>	
<p>12. Выписать 10 флаконов по 400 мл 0,5 % раствора новокаина (<i>Novocainum</i>). Назначить для инфильтрационной анестезии.</p>	
<p>13. Выписать 2% - ный раствор фенола(<i>Phenolum</i>) 5000 мл. Для дезинфекции рабочих столов.</p>	